



| | Schutz vor | | | Mindestalter | Grund-immunisierung | Nachimpfung | Wirksamkeit nach | Zulassung in Deutschland? | Adjuvantien | Thiomersal | Haltbarkeit | Packungsgrößen | Mögliche Nebenwirkungen |
|---|------------|------------------------|------------|--------------|---|--|------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------|--|
| | RHD1 | RHD2 | Myxomatose | | | | | | | | | | |
| Nobivac Myxo-RHD | Ja | - | Ja | 5 Wochen | Einmal | Jährlich | 3 Wochen | Ja | Enthält keines | Enthält keines | 4 Std. | Einzeldosis | Erhöhte Temperatur, leichte Schwellung und Lokalreaktionen an der Injektionsstelle wie Nekrosen, Schorf, Krusten oder Haarverlust, sehr seltenen tödliche Überempfindlichkeitsreaktionen, Impfmixomatose |
| Cunivac Combo | Ja | - | Ja | | | Halbjährlich | 10 Tagen | Ja | Aluminiumhydroxid 4mg/Dosis | 0,01mg/Dosis | 2 Std. | Einzeldosis, 10, 20 | Mildes Ödem an der Einstichstelle, Überempfindlichkeitsreaktionen, Impfmixomatose |
| Cunivac RHD | Ja | Kreuzimmunität zu RHD2 | - | Ab 4 Wo. | Einmal gegen RHD1 Zweimal im Abstand von 3 Wo. zum Schutz vor dem Tod durch RHD2 | Jährlich gegen RHD1, halbjährlich gegen RHD2 (Studien dazu fehlen) | 7 Tagen | Ja | Aluminiumhydroxid 4mg/Dosis | 0,02mg/Dosis | 8 Std. | Einzeldosis, 10, 20 | Keine bekannt, bei Auftreten dem Hersteller melden |
| RIKKA-VACC RHD | Ja | Kreuzimmunität zu RHD2 | - | Ab 4 Wo. | Einmal gegen RHD1 Zweimal im Abstand von 3 Wo. zum Schutz vor dem Tod durch RHD2 | Jährlich gegen RHD1, halbjährlich gegen RHD2 (Studien dazu fehlen) | 7 Tagen | Ja | Aluminiumhydroxid 6,0 - 7,5 mg/Dosis | 0,02mg/Dosis | 8 Std. | Einzeldosis, 10, 20 | Überempfindlichkeitsreaktionen |
| Filavac VHD K C+V | Ja | Ja | - | Ab 10 Wo. | Einmal | Jährlich (im Seuchenfall evtl. halbjährlich) | 7 Tagen | Nein, aber mit Ausnahmeregelung importierbar | Aluminiumhydroxid 0,35mg/Dosis | 0,42 mg Natriumdisulfid/Dosis | 2 Std. | Einzeldosis, 50, 200 | Bildung von vorübergehenden Knoten an der Einstichstelle |
| Filavac VHD Variant (muss importiert werden!) | - | Ja | - | Ab 4 Wo. | Zweimal im Abstand von 2 Wo. | Halbjährlich | 7 Tagen | Nein, aber mit Ausnahmeregelung importierbar | Aluminiumhydroxid 0,35mg/Dosis | 0,01mg/Dosis | 2 Std. | Einzeldosis, 40, 100 | Bildung von vorübergehenden Knoten an der Einstichstelle |
| Cunipravac RHD Variant | - | Ja | - | Ab 4 Wo. | Zweimal im Abstand von 6 Wo. | Halbjährlich | 7 Tagen | Nein, aber mit Ausnahmeregelung importierbar (Zulassungsverfahren für EU als ERAVAC, verfügbar ab voraussichtlich 09/2016) | Mineralöle 104,125 mg/Dosis | 0,05mg/Dosis | 8 Std. | 10, 40 | Leichte Temperaturerhöhung |